

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je velmi závažné, horečnaté, krvácivé onemocnění virového původu, přenášené komáry v tropických a subtropických oblastech Afriky, Střední a Jižní Ameriky, kterému se dá předcházet vakcinací. Toto onemocnění může probíhat ve 2 fázích a má vysokou smrtnost.

1. fáze trvá obvykle 3-6 dnů: nespecifické akutní virové onemocnění (horečka, bolest svalů, kloubů, únava, překrvení spojivek, nevolnost, zvracení)
2. fáze v 15 % případů: akutní horečnaté onemocnění s možnými krvácivými komplikacemi (vysoká horečka, bolesti břicha, zvracení, žloutenka, krvácení do kůže z úst, nosu, očí či do moči nebo trávicího traktu). Až 50 % pacientů v této fázi onemocnění umírá do 7-10 dní.

Indikace očkování:

- *cestujících do endemické oblasti*
- *cestujících do jakékoli země, která při vstupu vyžaduje zápis v mezinárodním očkovacím průkazu (to může nebo nemusí záviset na předchozí trase)*
- *manipulujících s potenciálně infekčním materiálem (např. personál v laboratořích)*

K očkování se využívá vakcína Stamaril. Jedná se o živou vakcínu, která se aplikuje minimálně 10 dní před vstupem do endemické oblasti v 1 dávkovém schématu s doživotní imunitou bez nutnosti revakcinace. Očkovat lze děti od 9 měsíců věku. U osob starších 60 let byly u malého procenta lidí popsány neurotoxické účinky vakcíny, a proto je nutné vakcinaci v této populaci zvážit individuálně. O vedlejších účincích bude pacient poučen při návštěvě naší ambulance. Záznam o očkování musí být zanesen do mezinárodního očkovacího průkazu.