

## **Klíšťová meningoencefalitida**

Klíšťová meningoencefalitida je virový zánět mozku a mozkových blan přenášený klíšťaty. Onemocnění má dvoufázový průběh - první fáze je chřipková, druhá fáze s postižením mozku a mozkových plen se rozvine za 1-2 týdny. Mezi nejčastější projevy patří teploty, bolesti hlavy a zvracení. Při postižení mozku mohou být poruchy hybnosti končetin - někdy trvalého charakteru. Při postižení prodloužené a krční míchy může dojít ke selhání základních životních funkcí a k smrti. Po prodělaném onemocnění někdy dochází k vývoji tzv. postencefalitického syndromu (dlouhodobé bolesti hlavy, úzkost, třes, poruchy paměti, spánku a soustředění). Mohou trvat několik měsíců i déle.

Jihočeský kraj je jednou z oblastí s vysokou promořeností klíšťat virem klíšťové meningoencefalitidy

Očkování: vakcína FSME Immun - základní očkovací schéma - den 0, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 6-12 měsíců, první přeočkování po 3 letech, dále po 5 letech (u lidí >60 let po 3 letech).

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u lidí nad 50 let. Očkování zajišťuje dobrou prevenci onemocnění, na které neexistuje léčba, léčíme pouze příznaky.